



C :RS22

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
(الدورة الاستدراكية 2007)
الموضوع

المادة: الرياضيات

3 : مدة الانجاز :

7 : المعامل :

الشعب (ة) : العلوم التجريبية الأصلية + العلوم التجريبية + العلوم الزراعية

(يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة)

التمرين الأول (3,5 ن)

- نعتبر في الفضاء المنسوب الى معلم متعامد ممنظم $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ النقط $A(2,0,-1)$ و $B(2,4,2)$ و $C(3,3,3)$ و الفلكة (S) التي معادلتها الديكارتية هي : $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 4y - 8z + 20 = 0$
- 1 (بين ان مركز الفلكة (S) هي النقطة $\Omega(2,2,4)$ وأن شعاعها يساوي 2) 1
 - 2 (ليكن (P) المستوى المار من النقطة A و العمودي على المستقيم (BC) . بين أن معادلة ديكارتية للمستوى (P) هي : $x - y + z - 1 = 0$) 0,75
 - 3 (أ - بين أن المستوى (P) يقطع الفلكة (S) وفق دائرة (Γ) شعاعها يساوي 1 . ب - حدد تمثيلا بارامتريا للمستقيم (Δ) المار من Ω و العمودي على (P) . ج - حدد مثلوث احداثيات النقطة ω مركز الدائرة (Γ) .) 1
0,25
0,5

التمرين الثاني (2,5 ن)

- يحتوي كيس على ثلاث بیدقات بيضاء و أربع بیدقات سوداء (لا يمكن التمييز بين البیدقات باللمس). نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاث بیدقات من الكيس .
- 1 (ما هو احتمال الحصول على بیدقتين بالضبط لونهما أبيض ؟) 0,75
 - 2 (ما هو احتمال الحصول على ثلاث بیدقات من نفس اللون ؟) 0,75
 - 3 (ما هو احتمال الحصول على بیدقة بيضاء على الأقل ؟) 1

التمرين الثالث (3 ن)

- لتكن (u_n) المتتالية المعرفة بما يلي : $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = \frac{1}{5}(u_n - 4n - 1)$ لكل n من \mathbb{N} . نضع $v_n = u_n + n - 1$ لكل n من \mathbb{N} .
- 1 (بين أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{5}$.) 1
 - 2 (أ - احسب v_n بدلالة n . ب - استنتج u_n بدلالة n ثم احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} u_n$) 0,5
 - 3 (نضع $T_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ و $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ حيث n عنصر من \mathbb{N} . بين أن : $T_n = \frac{1}{4} \left(5 - \frac{1}{5^n} \right)$ و أن $S_n = T_n - \frac{(n+1)(n-2)}{2}$ لكل n من \mathbb{N} .) 0,5
1

التمرين الرابع (3 ن)	
(1) تحقق من أن : $(\sqrt{2}+2i)^2 = -2+4\sqrt{2}i$.	0,25
(2) حل في مجموعة الأعداد العقدية \mathbb{C} المعادلة : $z^2 - (\sqrt{2}+2)z + 2 + \sqrt{2} - \sqrt{2}i = 0$	0,75
(3) نعتبر العددين العقديين $z_1 = 1-i$ و $z_2 = 1+\sqrt{2}+i$.	0,5
أ - حدد الشكل المثلثي للعدد العقدي z_1 .	0,5
ب - بين أن : $z_1 \cdot z_2 = \sqrt{2}\bar{z}_2$ (\bar{z}_2 هو مرافق العدد z_2) .	1
استنتج أن : $\arg(z_1) + 2\arg(z_2) \equiv 0[2\pi]$	
ج - حدد عمدة للعدد z_2 .	0,5
مسألة (8 ن)	
(I) لتكن g الدالة العددية المعرفة على $]0, +\infty[$ بما يلي : $g(x) = x - \frac{1}{x} - 2\ln x$.	
(1) بين أن $g'(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2}$ لكل x من $]0, +\infty[$ ثم استنتج منحنى تغيرات الدالة g على $]0, +\infty[$.	1
(2) بين أن $g(x) \leq 0$ لكل x من $]0, 1[$ و أن $g(x) \geq 0$ لكل x من $]1, +\infty[$ (لاحظ أن $g(1) = 0$) .	0,5
(II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $]0, +\infty[$ بما يلي : $f(x) = x + \frac{1}{x} - (\ln x)^2 - 2$.	
ليكن (C) المنحنى الممثل للدالة f في معلم متعامد ممنظم (o, \vec{i}, \vec{j}) .	
(1) أ - بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$ (يمكن وضع $t = \sqrt{x}$) ثم احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.	0,75
ب - تحقق من أن : $f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x)$ لكل x من $]0, +\infty[$.	0,25
ج - احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ (يمكن وضع $t = \frac{1}{x}$) ثم أول النتيجة هندسيا .	0,5
د - بين أن (C) يقبل فرعا شلجيميا اتجاهه المقارب هو المستقيم الذي معادلته هي : $y = x$.	10,5
(2) بين أن : $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$ لكل x من $]0, +\infty[$ ، ثم ضع جدول تغيرات الدالة f .	1,5
(3) أنشئ المنحنى (C) في المعلم (o, \vec{i}, \vec{j}) .	1
(4) أ - بين أن الدالة $G : x \ln x - x$ دالة أصلية للدالة $g : x \rightarrow \ln x$ على $]0, +\infty[$.	0,5
ب - باستعمال مكاملة بالأجزاء ، بين أن : $\int_1^e (\ln x)^2 dx = e - 2$.	0,75
ج - حدد مساحة حيز المستوى المحصور (C) و محور الإفاصيل و المستقيمين اللذين معادلتهما : $x = e$ و $x = 1$.	0,75